

# 接種前に必ずご確認ください。

R6年3月作成

※異なった注射生ワクチンを連続して接種する場合、接種翌日から28日目以降に接種可能です。

同一種類のワクチンを接種する場合は、規定の間隔を空けて接種してください。

## 定期予防接種の種類と対象者

対象年齢の「出生●週●日後まで※」とは、出生●週●日を含みます。

※生まれた日の翌日から起算して、生まれた日の翌日を出生0週1日後と考えます。

「未満」とは、その年齢に達する前日までです。

<乳幼児>

| 種類                                   |                | 回数  | 対象年齢              | 接種間隔                      |
|--------------------------------------|----------------|---|-------------------|---------------------------|
| ロタウイルス感染症<br><small>※右記のどちらか</small> | ロタリックス<br>(1価) | 1回目   | 生後2か月以上           | 初回接種を <b>出生14週6日後</b> までに |
|                                      |                | 2回目   | <b>出生24週0日後まで</b> | 1回目接種翌日から数えて28日目以降に       |
|                                      | ロタテック<br>(5価)  | 1回目   | 生後2か月以上           | 初回接種を <b>出生14週6日後</b> までに |
|                                      |                | 2回目   | <b>出生32週0日後まで</b> | 1回目接種翌日から数えて28日目以降に       |
|                                      |                | 3回目   |                   | 2回目接種翌日から数えて28日目以降に       |
|                                      | B型肝炎           | 1回目   | 生後2か月以上1歳未満       |                           |
| 2回目                                  |                | 1回目接種から28日目以降に  |                   |                           |
| 3回目                                  |                | 1回目接種から140日目(20週目)以降に                                       |                   |                           |
| 五種混合                                 | 初回1回目          | 生後2か月以上7歳6か月未満  |                   |                           |
|                                      | 初回2回目          |   | 1回目接種から21日目以降に    |                           |
|                                      | 初回3回目          |   | 2回目接種から21日目以降に    |                           |
|                                      | 追加             | 7歳6か月未満   | 3回目接種終了から6か月目以降に  |                           |
| 四種混合<br>(五種混合接種している場合は接種不要)          | 初回1回目          | 生後2か月以上7歳6か月未満  |                   |                           |
|                                      | 初回2回目          |   | 1回目接種から21日目以降に    |                           |
|                                      | 初回3回目          |   | 2回目接種から21日目以降に    |                           |
|                                      | 追加             | 7歳6か月未満   | 3回目接種終了から6か月目以降に  |                           |
| BCG                                  |                |   | 生後3か月以上1歳未満       |                           |
| 水痘                                   | 1回目            | 1歳以上3歳未満  |                   |                           |
|                                      | 2回目            |   | 1回目接種から3か月以降に     |                           |
| 麻しん・風しん混合(MR)                        | 1期             | 1歳以上2歳未満  |                   |                           |
|                                      | 2期             | 5歳以上7歳未満で、かつ小学校就学前1年間<br>(幼稚園・保育園の年長時の4月1日～翌年小学校入学前3月31日まで) |                   |                           |
| 日本脳炎1期                               | 初回1回目          | 3歳以上7歳6か月未満   |                   |                           |
|                                      | 初回2回目          |   | 1回目接種から7日目以降に     |                           |
|                                      | 追加             | 7歳6か月未満   | 2回目接種から6か月目以降に    |                           |

# 接種前に必ずご確認ください。

R6年3月作成

※異なった注射生ワクチンを連続して接種する場合、接種翌日から28日目以降に接種可能です。

同一種類のワクチンを接種する場合は、規定の間隔を空けて接種してください。

## 定期予防接種の種類と対象者

対象年齢の「出生●週●日後まで※」とは、出生●週●日を含みます。

※生まれた日の翌日から起算して、生まれた日の翌日を出生0週1日後と考えます。

「未満」とは、その年齢に達する前日までです。

<乳幼児>

| 種類                       | 接種開始年齢       | 回数           | 対象年齢                         | 接種間隔<br>※それぞれに標準的な接種間隔があります。<br>効果的な接種間隔については医師とご相談ください  |                |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--|----------------|
| ヒブ感染症（五種混合接種している場合は接種不要） | 生後2か月以上7か月未満 | 初回1回目        | 生後2か月以上7か月未満                 |  |                |
|                          |              | 初回2回目        | 1歳未満<br>(超えた場合は接種しない)        | 1回目接種から28日目以降に<br>(医師が必要と認めた場合は21日目以降に)  |                |
|                          |              | 初回3回目        | 1歳未満<br>(超えた場合は接種しない)        | 2回目接種から28日目以降に<br>(医師が必要と認めた場合は21日目以降に)  |                |
|                          |              | 追加           | 5歳未満                         | 3回目接種終了から7か月目以降に<br><br>(2回目または3回目が1歳未満に終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回接種に係る最後の注射終了後28日目以降(医師が必要と認めた場合は21日目以降)に) |                |
|                          | 生後7か月以上1歳未満  | 初回1回目        | 生後7か月以上1歳未満                  |  |                |
|                          |              | 初回2回目        | 1歳未満<br>(超えた場合は接種しない)        | 1回目接種から28日目以降に<br>(医師が必要と認めた場合は21日目以降に)  |                |
|                          |              | 追加           | 5歳未満                         | 2回目接種終了から7か月目以降に<br><br>(2回目が1歳未満に終了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回1回目終了後28日目以降(医師が必要と認めた場合は21日目以降)に)              |                |
|                          | 1歳以上5歳未満     | 初回1回目        | 1歳以上5歳未満                     |  |                |
|                          | 小児の肺炎球菌感染症   | 生後2か月以上7か月未満 | 初回1回目                        | 生後2か月以上7か月未満   |                |
|                          |              |              | 初回2回目                        | 2歳未満   | 1回目接種から28日目以降に |
| 初回3回目                    |              |              | 2歳未満(※2回目が1歳を超えた場合3回目は接種しない) | 2回目接種から28日目以降に   |                |
| 追加                       |              |              | 1歳以上5歳未満                     | 3回目接種終了から61日目以降に   |                |
| 生後7か月以上1歳未満              |              | 初回1回目        | 生後7か月以上1歳未満                  |  |                |
|                          |              | 初回2回目        | 2歳未満                         | 1回目接種から28日目以降に   |                |
|                          |              | 追加           | 1歳以上5歳未満                     | 2回目接種終了から61日目以降に   |                |
| 1歳以上2歳未満                 |              | 初回1回目        | 1歳以上2歳未満                     |  |                |
|                          |              | 追加           | 1歳以上5歳未満                     | 2回目接種終了から61日目以降に   |                |
| 2歳以上5歳未満                 |              | 初回1回目        | 2歳以上5歳未満                     |  |                |

# 接種前に必ずご確認ください。

R6年3月作成

## 定期予防接種の種類と対象者

※異なった注射生ワクチンを連続して接種する場合、接種翌日から28日目以降に接種可能です。

同一種類のワクチンを接種する場合は、規定の間隔を空けて接種してください。

対象年齢の「未満」という言葉は、その年齢に達する前日までとなりますのでご注意ください。

### <児童・生徒 定期予防接種>

| 予防接種の種類 | 対象年齢       |
|---------|------------|
| 二種混合    | 11歳から13歳未満 |
| 日本脳炎 2期 | 9歳から13歳未満  |

## ●日本脳炎1期・2期 予防接種特例措置制度

★[対象者] **平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方**

| 予防接種の種類   | 回数    | 対象年齢      | 接種間隔<br>(標準的な接種間隔があります。効果的な接種間隔については医師とご相談ください) |
|-----------|-------|-----------|---|
| 日本脳炎1期特例  | 初回1回目 | 20歳未満     | 1回目接種から7日目以降に                                   |
|           | 初回2回目 |           |   |
|           | 追加    |           |   |
| 日本脳炎2期 特例 |       | 9歳から20歳未満 | 追加接種から7日目以降に                                    |

### 【接種間隔】

◆平成23年5月20日までに、接種を全く受けていない者

1期初回1回目 ⇒ 1期初回2回目 ⇒ 1期追加 ⇒ 2期(9歳以上)

(接種翌日から数えて7日目～29日目)

(おおむね1年後)

(接種翌日から数えて7日目以降)

※ 通常、第1期追加接種終了後、おおむね5年の間隔をおいて接種します。接種時期については、医師と相談してください。

◆平成23年5月20日までに、1期初回1回のみ終了している者

1期初回2回目 ⇒ 1期追加 ⇒ 2期(9歳以上)

(接種翌日から数えて7日目以降)

(接種翌日から数えて7日目以降)

◆平成23年5月20日までに、1期初回1回目及び2回目が終了している者

1期追加 ⇒ 2期(9歳以上)

(接種翌日から数えて7日目以降)

※平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方の特例措置制度は終了しました

# 接種前に必ずご確認ください。

子宮頸がん予防ワクチン接種の対象者と接種間隔

※必ず同じワクチン同士の接種間隔は守るようにしてください。  
また、新型コロナウイルス接種前後2週間は受けることができないのでご注意ください。

令和6年3月現在

| 対象者<br>(対象期間)                                     | 子宮頸がん予防ワクチンの種類<br>(3種類のうちいずれか1種類)             | 回数  | 標準的な接種間隔          | 標準的な接種間隔で<br>接種できない場合                            |  |
|---|---|-----|-------------------|--|--|
| 中学1年生～高校1年生相当の年齢の女子<br>( <b>高校1年生相当の3月31日まで</b> ) | サーバリックス<br>(2価)                               | 1回目 |                   |  |  |
|   |   | 2回目 | 1回目から <b>1か月後</b> | 1回目から <b>1か月以上</b> の間隔をあける                       |  |
|   |   | 3回目 | 1回目から <b>6か月後</b> | 1回目から <b>5か月以上</b> かつ2回目から <b>2か月半以上</b> の間隔をあける |  |
|   | ・ガーダシル(4価)<br>・シルガード(9価)1回目接種が<br>15歳以上の場合    | 1回目 |                   |  |  |
|   |   | 2回目 | 1回目から <b>2か月後</b> | 1回目から <b>1か月以上</b> の間隔をあける                       |  |
|   |   | 3回目 | 1回目から <b>6か月後</b> | 2回目から <b>3か月以上</b> の間隔をあける                       |  |
|   | ・シルガード(9価)1回目の接種<br>を中学1年生～15歳未満に実施す<br>る場合※1 | 1回目 |                   |  |  |
|   |   | 2回目 | 1回目から <b>6か月後</b> | 1回目から少なくとも <b>5か月以上</b> の間隔<br>をあける              |  |
|   | ※基本的には、全て同じワクチンを接種する必要があります。                  |     |                   |  |  |

## ※1 シルガード(9価)の2回接種について

シルガード(1回目接種が中学1年生～15歳未満の場合)…**基本2回接種**だが、1回目と2回目の接種間隔が**5か月未満**の場合、**3回目接種が必要**。3回接種の場合の接種間隔は「1回目接種が15歳以上の場合」と同様。

## ※2 接種間隔の考え方

1か月後は、「翌月の同日以降」を意味します。

翌月に同日がない場合は、「翌々月の1日」になります。

例：9月30日の1か月後は10月30日、1月30日の1か月後は3月1日。

最新の情報は厚労省ホームページで  
ご確認ください。



キャッチアップ接種については  
裏面に記載しています。

## 子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種の対象者と期間

令和6年3月現在

接種期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間

| 対象者<br>(対象期間)   | 子宮頸がん予防ワクチンの種類<br>(3種類のうちいずれか1種類) | 回数  | 標準的な接種間隔          | 標準的な接種間隔で<br>接種できない場合                            |  |
|---|-----------------------------------|-----|-------------------|--|--|
| 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの子<br>(令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に<br><b>高校2年生相当以上の者</b> ) | サーバリックス<br>(2価)                   | 1回目 |                   |  |  |
|   |                                   | 2回目 | 1回目から <b>1か月後</b> | 1回目から <b>1か月以上</b> の間隔をあける                       |  |
|   |                                   | 3回目 | 1回目から <b>6か月後</b> | 1回目から <b>5か月以上</b> かつ2回目から <b>2か月半以上</b> の間隔をあける |  |
|   | ガーダシル(4価)<br>もしくはシルガード(9価)        | 1回目 |                   |  |  |
|   |                                   | 2回目 | 1回目から <b>2か月後</b> | 1回目から <b>1か月以上</b> の間隔をあける                       |  |
|   |                                   | 3回目 | 1回目から <b>6か月後</b> | 2回目から <b>3か月以上</b> の間隔をあける                       |  |
|   | ※基本的には、全3回とも同じワクチンを接種する必要があります。   |     |                   |  |  |

最新の情報は厚労省ホームページで  
ご確認ください。

